

Ingeniería Fitosanitaria Ecuatoriana Infiec Cía. Ltda.

Dirección: Av. Cuenca-Naranjal s/n y Del Jengibre sector Medio Ejido

Telf: (+593) 074138008 / (+593) 0984731467

Website: <http://www.infiec.com>

Email: info@infiec.com

FICHA TÉCNICA

LANCHIATEX® (Famoxadone 225 g/kg + Cymoxanil 300 g/kg WG)

1. FABRICANTE Y TITULAR DE REGISTRO

Fabricante:

Nanjing Egrow Crop Protection Co. Ltd.

Room 423, 4th floor, Office Building, No. 58, Guabu Shuangxiang Road, Xiongzhou Street, Liuhe District, Nanjing - China

Titular del registro: Nº 101-F4/NA

Ingeniería Fitosanitaria Ecuatoriana Infiec Cía. Ltda.

Dirección: Av. Cuenca-Naranjal s/n y Del Jengibre sector Medio Ejido

Teléfono: +593074138008

E-mail: info@infiec.com

Cuenca – Ecuador

2. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Clase: FUNGICIDA

Nombre producto: LANCHIATEX®

Nombre común: Famoxadone + Cymoxanil

Grupo químico: Famoxadone: Oxazole

Cymoxanil: Cyanoacetamide oxime

Famoxadone: C22H18N2O4

Cymoxanil: C7H1ON4O3

Concentración: Famoxadone: 225 g/kg - 22,5 %

Cymoxanil: 300 g/kg - 30 %

Formulación: Gránulos Dispersables - WG

Apariencia: Azul

Estado físico: Gránulos

pH: 4,0-8,0

Olor: Olor característico

Densidad: N/A

Inflamabilidad: No inflamable

Explosividad: No explosivo

Corrosividad: No corrosivo

3. PROPIEDADES DEL PRODUCTO FORMULADO

Fungicida en formulación gránulos dispersables (WG) de color azul, que actúa como protectante y curativo en los estados iniciales de la enfermedad, perteneciente al grupo de los Cyanoacetamidas y Oxazoles. Controla hongos de la familia peronosporales, inhibiendo la germinación de esporas y afecta la formación de hifas de los patógenos. Con una rápida detección de la enfermedad y control oportuno.

Modo y mecanismo de acción

Cymoxanil: Fungicida sistémico y de contacto, preventivo, curativo de postinfección y erradicante, penetrante y con acción traslaminar, es efectivo contra la mayoría de los hongos del orden Peronosporale afectando respiración, biosíntesis de aminoácidos, metabolismo de la uridina y permeabilidad de las membranas.

Ingeniería Fitosanitaria Ecuatoriana Infiec Cía. Ltda.

Dirección: Av. Cuenca-Naranjal s/n y Del Jengibre sector Medio Ejido

Telf: (+593) 074138008 / (+593) 0984731467

Website: <http://www.infiec.com>

Email: info@infiec.com

Faxomadone: Protector y residual. Evita la germinación de esporas. Inhibe el transporte de electrones en la mitocondria. Previene la diferenciación de los esporangios en zoosporas, inhibe la movilidad de las zoosporas y les ocasiona la lisis en cuestión de minutos. Es efectivo contra fitopatógenos resistentes a los fungicidas tradicionales convirtiéndose en una molécula innovadora para prevenir y erradicar el desarrollo del hongo en otras áreas.

4. TOXICIDAD

Rata oral aguda DL50 mg / kg:	1000 mg / kg
DL50 dérmico agudo / kg:	>5000 mg/kg
Inhalación LD50 mg / l / hora:	N/A
Irritación de la piel de conejo:	No irritante
Irritación de ojo:	No irritante
Sensibilización en conejillo de Indias:	No sensibilizante

5. CULTIVO, PLAGA Y DOSIS

Cultivo	Plaga	Dosis Kg/ha	PC
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Tizon Tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	1,00	7 días

*Volumen de agua utilizado para la aplicación: 400 litros/ha

6. MODO DE EMPLEO

Agite el producto antes de utilizar, aplicar en las partes aéreas de las plantas, de manera continua y uniforme cubriendo en forma homogénea todo el follaje,

7. COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de plaguicidas a excepción de soluciones acidas fuertes soluciones alcalinas fuertes, en el caso de realizar mezclas no recomendadas hacer una prueba a pequeña escala para garantizar su compatibilidad. Toda mezcla fuera de la recomendada no será responsabilidad del titular de registro.

8. REINGRESO A UN ÁREA TRATADA

Esperar un periodo de 12 horas luego de la aplicación del producto para reingresar al área tratada.

9. FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico si se utiliza en las dosis recomendadas.

10. RECOMENDACIONES DE USO

1. Peligro para los seres humanos y los animales domésticos.
2. Mantener fuera del alcance de los hijos y animales domésticos. evitar el acceso por personal no autorizado.
3. Provoca irritación ocular moderada. Nocivo si se ingiere, inhala o absorbe a través de la piel. NO se ponga en los ojos. Evite el contacto con la piel. Evite la inhalación de vapores y la niebla en aerosol. Lávese las manos y la cara después de manipular y antes de comer o fumar.
4. Usar, ropa adecuada durante las aplicaciones: overol y camisa de manga larga, pantalones largos, botas, guantes resistentes a productos químicos, gafas y mascarilla de protección para la boca y la nariz. Quítense la ropa inmediatamente si el pesticida entra. Luego lave bien y póngase ropa limpia.

Ingeniería Fitosanitaria Ecuatoriana Infiec Cía. Ltda.

Dirección: Av. Cuenca-Naranjal s/n y Del Jengibre sector Medio Ejido

Telf: (+593) 074138008 / (+593) 0984731467

Website: <http://www.infiec.com>

Email: info@infiec.com

-
5. Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón. Cámbiese la ropa contaminada.
 6. Evite la contaminación de ríos, lagos, arroyos o estanques y alimentos.
 7. Limpie el equipo inmediatamente después de la pulverización disponer de agua de lavado en la que no contaminen los alimentos, el pastoreo, pozos, ríos o represas.
 8. Una vez utilizado todo el contenido del envase proceda a realizar el triple lavado y ierta la solución en la mezcla de aplicación, depositelo en el lugar seguro y devuélvalo al distribuido.
 9. Por ningún motivo vuelva a utilizar los envases vacíos para cualquier otro propósito.

11. PRESENTACIONES

250g, 500g, 1Kg, 25Kg, 1000Kg

12. IMPORTADO Y DISTRIBUIDO:

Ingeniería Fitosanitaria Ecuatoriana Infiec Cía. Ltda.

Dirección: Av. Cuenca-Naranjal s/n y Del Jengibre sector Medio Ejido

Teléfono: (+593) 074138008

E-mail: info@infiec.com

Cuenca – Ecuador

13. RESPONSABILIDAD

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

LANCHIATEX® es una marca registrada de Ingeniería Fitosanitaria Ecuatoriana Infiec Cía. Ltda.

CATEGORÍA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO, LEA CUIDADOSAMENTE LA INFORMADA PRESENTADA

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

