


LIMINAR 500 SC

Suspensión concentrada SC

FABRICANTE: TAGROS CHEMICALS INDIA PRIVATE LIMITED

FORMULADOR: TAGROS CHEMICALS INDIA PRIVATE LIMITED

- **Tipo de producto:** Herbicida pre-emergente
- **Ingrediente Activo:** Sulfentrazone



- **Concentración:** 500 g/l
- **Formulación:** Suspensión concentrada (SC)
- **Grupo químico:** Aryl triazolinone
- **Modo de acción:** Sistémico.
- **Mecanismo de acción:** Absorbido por las raíces y el follaje y translocado. Alteración de la membrana celular – inhibidor de la PPO.

- **Recomendaciones de uso:**

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	Botoncillo: (<i>Eclipta prostrata</i>) Bledo: (<i>Amaranthus hybridus</i>) Lechosa: (<i>Euphorbia hirta</i>)	1,8 L/ha	Aplicar en preemergencia de malezas; y debe ser incorporado al suelo con lluvia o con riego.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APlicAR EL PRODUCTO Durante el manejo, preparación de la mezcla y la aplicación de LIMINAR 500 SC siempre utilice equipo

Tagros Chemicals India Private Limited

"Jhaver Centre" 4th Floor, R. A. Building, 72, Marshalls Road, Egmore, Chennai – 600008 INDIA

Phone: (91) 44 42007400 Fax: (91) 44 28587873

E-mail: info@tagros.com Website: www.tagros.com

de protección personal. El agua a utilizar para la aplicación debe estar libre de sedimentos y tener un pH entre 5.5-7.0, si es necesario, adicionar un buferizante. Colocar agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de mezclado y en un recipiente aparte preparar la premezcla en un lugar ventilado, lejos de fuentes de agua y solo la cantidad de mezcla a utilizar. Para medir la cantidad exacta del producto, utilice un equipo graduado. Agregar la dosis recomendada; Agitar y vaciar la solución de la pre-mezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar a fin de homogeneizar la solución de la mezcla.

RESTRICCIONES DE USO: Pre-siembra de cultivo y malezas. Tiempo de reingreso al área tratada: 24 horas después de la aplicación

LIMINAR 500 SC es compatible con los herbicidas de uso corriente. De todos modos se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa, antes de utilizar cualquier tipo de mezcla.

FITOTOXICIDAD:

A las dosis recomendadas no se presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendado. En casos de condiciones ambientales severas, tales como lluvias excesivas o bajas temperaturas luego de la aplicación, pueden observarse leves síntomas de fitotoxicidad en el cultivo. Estos síntomas se manifiestan como ligera clorosis internerval, son completamente reversibles, y no afectan el rendimiento.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

Tagros Chemicals India Private Limited

"Jhaver Centre" 4th Floor, R. A. Building, 72, Marshalls Road, Egmore, Chennai – 600008 INDIA

Phone: (91) 44 42007400 Fax: (91) 44 28587873

E-mail: info@tagros.com Website: www.tagros.com